

TESTS ALLERGOLOGIQUES CUTANES

Précautions à prendre en cas de prise d'antihistaminiques

Vous allez prochainement être hospitalisé(é) pour un bilan à la recherche d'une allergie médicamenteuse. Durant cette hospitalisation, seront pratiqués des tests cutanés dont la réalisation nécessite que vous ayez pu, si possible, arrêter la classe de médicaments suivants :

- **Les médicaments antihistaminiques** (ou encore appelés anti-allergiques) : ils peuvent masquer certains des tests qui vous seront pratiqués. Il faut donc **arrêter ces médicaments au moins cinq jours avant votre hospitalisation**. Si votre état de santé nécessite la prise régulière de ces médicaments et qu'un arrêt de cinq jours n'est pas possible, merci d'en informer le médecin qui vous suit et/ou la surveillante du service.

Une liste des médicaments pouvant gêner l'interprétation des tests cutanés est mise en annexe de ce document (confer verso). Merci de vous y référer et de signaler tout problème à votre ou vos médecins respectifs.

L'Equipe médicale et para-médicale

CONTACTS

Assistant Chef de Clinique et Interne – Téléphone : 04.78.86.15.33

Surveillante – Téléphone : 04.78.86.10.76

Infirmières – Téléphone : 04.78.86.15.34

LISTE DES MEDICAMENTS :

A ARRETER, SI POSSIBLE, 5 JOURS AVANT L'HOSPITALISATION

ANTI-HISTAMINIQUES H 1

ANTI-HISTAMINIQUES NON SEDATIFS

AERIUS (Desloratadine) :	cp
CETIRIZINE :	cp
CLARYTINE (Loratidine) :	cp, sirop
KESTIN (Ebastine) :	cp
MISTALINE (Mizolastine) :	cp
MIZOLLEN (Mizolastine) :	cp
PRIMALAN (Méquitazine) :	cp, sirop
REACTINE (Cétirizine) :	cp
TELFAS (Fexofénadine) :	cp
QUITADRILL (Mequitazine) :	cp
VIRLIX (Cétirizine) :	cp, solution buvable
XYZALL (Levocetirizine) :	cp
ZYRTEC (Cétirizine) :	cp, solution buvable
ZYRTECSET (Cétirizine) :	cp

ANTI-HISTAMINIQUES SEDATIFS

ALLERGEFON (Carbinoxamine) :	cp
APAISYL (Isothipendyl) :	cp, crème
APHILAN, APHILAN RETARD (Buclizine)	cp
PERIACTINE (Cyproheptadine)	cp
DIMEGAN, DIMEGAN LP (Bromphéniramine) :	cp, sirop, inj
HISMANAL (Asthémizole) :	cp
ISTAMYL gel en application locale	
PERIACTINE (Cyproheptadine) :	cp
PHENERGAN (Prométhazine) :	cp, sirop, inj
POLARAMINE REPETABS	
POLARAMINE (Dexchlorphéniramine) :	cp, sirop, inj
THERALENE (Alimémazine) :	cp, sirop, inj

ANTI-ALLERGIQUES DIVERS

ATARAX (Hydroxycine) :	cp, sirop, inj
HYPOSTAMINE (Tritoqualine) :	cp ou Tritoqualine
INTERCRON (cromoglycate disodique) :	ampoule buvable
NALCRON (cromoglycate disodique) :	ampoule buvable
SINGULAIR (Montélukast) :	cp

SIROPS ANTI-TUSSIFS ANTI-HISTAMINIQUES

FLUISEDAL (Prométhazine)
RHINATIOL (Prométhazine)
Sirop Teysedre
CALMIXENE (Primetixene)
TOPLEXIL (Oxomemazine)
BRONCALENE (Chlorphenamine)
HEXAPNEUMINE (Chlorphenamine)

ATTENTION !

TINSET (OXATOMIDE) doit être arrêté
5 semaines avant les tests cutanés

KETOTIFENE (ZADITEN) doit être arrêté
4 semaines avant les tests cutanés

Certains COLLYRES, SPRAY NASAL,
contiennent des anti-histaminiques