



INTOLERANCE AUX GANTS MEDICAUX

D.VITAL DURAND

URCC 20/04/2007



2 types de réactions



Irritation

La plus fréquente

**Inflammation
non spécifique**



Allergie

**Inflammation spécifique
par sensibilisation à un
constituant du gant**



La dermite irritative

- **Tous les types de gants**
- D'apparition progressive
- Localisée à la zone de contact
- Monomorphe : peau rouge, sèche, rugueuse, crevassée

Peu de vésicules

- Brûlures > prurit
- Facteurs favorisants :
 - **tout acte fragilisant la peau** : lavages répétés, détergents-désinfectants, port prolongé de gants (chaleur, macération, microérosions dues à la poudre)
 - terrain atopique, peaux fragiles, peaux irritables

PREVENTION



- **Lavage des mains:**

Savon surgras pour peaux sèches (gammes DOVE ou VENDOME).

Bien sécher, sans frotter. Minimiser le nombre de lavages.

- **Crème hydratante plusieurs fois par jour**

Crèmes ATODERM (Bioderma), TOPIALYSE Sensitive (SVR),

Baume LIPIKAR (Roche Posay), Baume ICTYANE H.D (Ducray)

Crèmes protectrices : BARIEDERM (Uriage),

Crème barrière EXOMEGA (A-Derma)

- 
-
- **A la maison : port de gants, de préférence vinyle et non poudrés** (www.parallerg.com)

Les gants suppriment les contacts avec les substances irritantes (fruits, légumes, détergents, poussière...) et évitent des lavages des mains.

- **Le soir crème réparatrice émolliente, surtout en hiver**

Pommade Bepantheme, Cérat frais de Galien, Cold Cream
Si besoin sous des gants de coton pendant la nuit



PREVENTION

- **Prévention de la dermatite irritative**
car "l'irritation fait le lit de l'allergie"
- **En cas d'allergie immédiate au latex : contre-indication définitive des gants latex**
 - ↳ Gants vinyle
 - ↳ Gants caoutchoucs synthétiques : nitrile, ou néoprène
- **En cas d'allergie retardée aux additifs de fabrication**
 - ↳ Gants caoutchouc garantis sans additifs :
 - Nitrile type N-Dex Free (Best)
 - Néoprène type Dermaprène Ultra (Ansell)
 - ↳ Gants vinyle